


Sedi del Corso:
Hotel Relais BELLARIA
SALA CONVEGNI GIRASOLE
Via Altura, 11/bis
40139 Bologna (BO)

Casa Di Cura Villa Laura
Via Emilia Levante, 137/2
40139 Bologna (BO)



SEGRETERIA SCIENTIFICA :

Dr. V.M. Greco

Dr.ssa M. D'Ambra

Dr. M. Laterza

Tel. 051 6363931

email: vincenzomaria.greco@aosp.bo.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Anna Rita Celani

Bard Spa

Tel.: 06 524931

Fax: 06 5295042

email: infodavol@crbard.com

BARD Didact
Where Knowledge Leads[®]

Bard Didact[®] è un programma educativo svolto in collaborazione con i migliori centri ospedalieri, in grado di offrire opportunità formative per un'ampia gamma di prodotti all'avanguardia, tecniche innovative e applicazioni cliniche.

In collaborazione con


IBARID

THE HERNIA REPAIR COMPANYSM

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Emergenza Urgenza
Chirurgia Generale e dei Trapianti
U.O. Chir. Gen. Prof. F. Minni
Day Surgery Ref. Dott. V. M. Greco





L'ernia ombelicale rappresenta circa il 6% di tutte le ernie della parete addominale nell'adulto, si manifesta prevalentemente tra i 35 ed i 60 anni, nel sesso femminile (rapporto 4:1 tra F e M) e si caratterizza per una alta percentuale di complicanze quali incarceramento e strozzamento (circa il 13%).

Può essere di dimensioni piccole (diametro del colletto erniario < 2 cm), medie (da 2 a 4 cm) e grandi (> 4 cm).

Prenderemo in considerazione alcuni punti controversi nel trattamento chirurgico dell'ernia ombelicale dai quali dipende essenzialmente anche la scelta della protesi utilizzata; scelta che rappresenta essa stessa un attuale elemento di discussione:

1. PLASTICA DIRETTA vs PROTESI
2. ANESTESIA LOCALE vs GENERALE
3. CHIRURGIA OPEN vs LAPAROSCOPIA
4. SCELTA DELLA PROTESI

La riparazione protesica è il trattamento di scelta per tutti i tipi di ernia ombelicale (indipendentemente dalle dimensioni), in quanto garantisce percentuali minime di recidiva.

Nella maggior parte dei casi un'ernia ombelicale può essere trattata in anestesia locale (Levobupivacaina e/o Mepivacaina), evitando così i rischi, gli effetti collaterali e le complicanze proprie dell'anestesia generale. L'anestesia generale potrebbe risultare utile in casi selezionati (pazienti obesi o poco collaboranti, ernie di grandi dimensioni) e naturalmente in caso di riparazione per via laparoscopica.

Nell'ernioplastica open con protesi intraperitoneale la mesh appositamente ideata per i difetti medio-piccoli è rappresentata dalla Ventralex Hernia Patch, che ha la caratteristica di avere un versante viscerale ed uno parietale con anello di memoria che ne garantisce la distensione dopo l'impianto e due "alette" che ne consentono il fissaggio sul piano fasciale.

A nostro avviso, considerando anche i dati EBM, nei difetti medio-piccoli è opportuno eseguire una riparazione in anestesia locale, per via open, in regime di Day Surgery; la laparoscopia e l'anestesia generale possono essere utili in alcuni difetti più ampi, in caso di recidive o in caso di difetti multipli associati.

La chirurgia dei difetti ombelicali maggiori è, in fine, del tutto assimilabile a quella dei laparoceli.

Tale iniziativa affianca quella sulla tailored surgery nell'ernia inguinale che portiamo avanti da qualche anno; anche in questo caso ci auguriamo che l'opportunità di una iniziativa di carattere pratico volta ad un amichevole confronto in sala operatoria possa essere utile e gradita a tutti noi.

Vincenzo Maria Greco

www.ernia.eu



PROGRAMMA

I GIORNO

presso Hotel Relais BELLARIA
SALA CONVEGNI GIRASOLE

17.30 Sessione teorica
Razionale degli interventi e dettagli di tecnica
Presentazione dei casi

20.30 Cena Sociale

II GIORNO

presso Casa Di Cura Villa Laura

E' prevista la partecipazione diretta dei corsisti alla seduta operatoria

8:00 Sala Operatoria
Trattamento di ernie ombelicali con Ventralex, protesi endoperitoneale con accesso anteriore

14:00 Colazione di lavoro